

### 環境調査結果のお知らせ

#### 概況

本日、環境調査を行いましたので結果を送付いたします。

検鏡の結果、魚類に対して有害とされる**コクロディニウム・ポリクリコイデス**が最大で **142細胞/mL**確認されました。

**コクロディニウム・ポリクリコイデスは100細胞/mL（警戒基準）を上回っており、漁業被害の発生が懸念されますので、海や養殖魚の状態に応じて餌止め等の慎重な養殖管理をお願いします。**

今後、これらの種はさらに増殖する可能性がありますので、十分にご注意ください。

今後、飼育魚や海色等に異常が確認された場合は、海水をペットボトル等で採集し、漁協もしくは宿毛漁指導所にご連絡下さい。

調査点 (透明度/水深) 【調査時刻】	海洋環境				プランクトン
	深度 (m)	水温 (°C)	塩分	溶存酸素 (mg/L)	コクロディニウム・ ポリクリコイデス
A 藻津 (-/35.4m) 【09:19】	0	21.0	23.2	8.0	0
	★ 5	21.9	33.9	6.7	0
	10	21.8	34.2	7.1	8
	15	21.7	34.3	6.8	-
	20	21.6	34.4	6.8	-
B 大島中央 (-/30.3m) 【09:28】	0	21.9	29.4	7.2	0
	★ 5	21.9	34.0	6.7	0
	10	21.8	34.3	6.7	0
	15	21.6	34.3	6.8	-
	20	21.5	34.3	6.5	-
C 小筑紫中央 (-/47.7m) 【09:38】	★ 0	22.0	29.5	7.5	0
	5	21.9	34.3	6.5	0
	10	21.8	34.3	6.9	0
	15	21.6	34.3	6.6	-
	20	21.5	34.3	6.6	-
D 栄喜奥 (-/9.9m) 【09:58】	0	21.7	25.0	7.7	0
	★ 3	22.2	33.8	7.9	28
	5	22.0	33.9	7.7	52
	10	21.9	34.0	7.3	8
E ヒロウラ (-/24.8m) 【10:25】	0	21.7	22.4	8.1	0
	★ 3	22.2	33.7	8.2	130
	5	22.4	34.0	7.9	142
	10	21.9	34.1	7.4	8
	15	21.8	34.1	7.1	-
	20	21.7	34.2	6.8	-
F 青瀬山 (-/15.5m) 【10:06】	0	21.4	17.0	7.5	0
	★ 3	22.0	33.7	8.5	72
	5	22.2	33.9	7.8	44
	10	21.6	33.9	8.1	12
	15	21.5	34.0	6.6	-

クロロフィル量が極大の深度および、0m、5m、10mの深度から採水した海水の検鏡を実施しています。

★：採水したサンプルの内クロロフィルが極大であったもの

こちらの「環境調査」は、高知マリンイノベーション情報発信システム「NABRAS」(URL：<https://kmi-nabras.pref.kochi.lg.jp>)においてもご覧いただけます。


参考：有害プランクトンの種類と注意及び警戒基準

有害プランクトン	被害	注意基準 (※1)	警戒基準 (※2)	主な赤潮発生時期 ※3
				宿毛湾
コクロディニウム・ポリクリコイデス	魚類等のへい死	10 cells/mL	100 cells/mL	5~6月

※1 注意基準：餌食いの悪化、警戒基準に達する恐れのある密度


※2 警戒基準：魚類及び二枚貝のへい死並びに二枚貝の毒化が想定される密度

※3 あくまで目安なので、水産試験場・漁業指導所の広報や養殖魚の状態に応じて、慎重な養殖管理をお願いします。



- A: 藻津
- B: 大島中央
- C: 小筑紫中央
- D: 栄喜奥
- E: ヒロウラ
- F: 青瀬山

コクロディニウム・ポリクリコイデス  
最大細胞密度



凡例

プランクトンの細胞密度を示す円の大きさ  
円のサイズが大きいほど、プランクトンの数が多いので注意してください。

0  
×

1~9  
●

10  
○

100  
○

1,000  
○

10,000  
○

100,000  
○

300,000  
○

注意・警戒を示す円の色

黄・赤色の円が確認された場合は、魚介類に悪影響が生じる可能性がありますので、注意してください。  
基準値は、「参考：有害プランクトンの種類と注意及び警戒基準」を参照ください。

注意基準の値以上



警戒基準の値以上

